

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

Baneocin 250 TV/5000 TV/g tepalas bacitracino cinko kompleksas, neomicino sulfatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
- Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
- Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

1. Kas yra Baneocin ir kam jis vartojamas
2. Kas žinotina prieš vartojant Baneocin
3. Kaip vartoti Baneocin
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Baneocin
6. Pakuotės turinys ir kita informacija

1. Kas yra Baneocin ir kam jis vartojamas

Baneocin yra priešbakterinis vaistas, skirtas vartoti ant odos. Jis naikina tam tikras bakterijas, sukeliančias odos ligas.

Baneocin vartojamas:

- gydyti plaukų maišelių ir prakaito liaukų infekcijas, odos pūlinėlius (ektimą)
- gydyti aplink nagus esančių odos kantelių infekcijas
- gydyti impetigą (paviršinių odos sluoksnį pažeidžiančią infekciją) ir tam tikras odos opas
- gydyti bakterijomis užkrėstą niežintį išbėrimą (egzemą), plėštines žaizdas ar pjūvius
- kartu su kitais vaistais gydyti ausies uždegimą
- siekiant išvengti infekcijos po nudegimo ar nuplikinimo
- kartu su kitais vaistais gydyti bei siekiant išvengti infekcijos po chirurginės operacijos (plastinės operacijos, odos persodinimo, pūlių sankaupos gydymo, žaizdos ar rando po kitokios operacijos)

2. Kas žinotina prieš vartojant Baneocin

Baneocin vartoti negalima:

- jeigu yra alergija bacitracinui, neomicinui, kitiems aminoglikozidų grupės antibiotikams (pvz., gentamicinui, amikacinui) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);
- jeigu reikia gydyti **sunkų didelio odos ploto pažeidimą**. Veikliosios šio vaisto medžiagos gali patekti į organizmą ir sukelti šalutinius poveikius klausai, įskaitant kurtumą;
- jeigu sergate sunkia **širdies arba inkstų liga**;
- jeigu praityje buvo **pažeista vidinė ausis** arba ausies viduje esantis pusiausvyrą kontroliuojantis organas;
- jeigu pažeistas **ausies būgnelis**.

Nevartokite šio vaisto, jeigu kuri nors iš išvardytų būklių Jums tinka. Jeigu nesate dėl to tikri, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Baneocin tepalo.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju ar vaistininku, prieš pradėdami vartoti Baneocin.

Pasakykite gydytojui:

- jeigu Jūsų **kepenų arba inkstų veikla yra sutrikusi**;
- jeigu vartojate **didesnę nei rekomenduojama dozę** - ypač gydant sunkiai gyjančias opas. Stebėkite, ar neatsiranda bet kokių požymių, galinčių rodyti **inkstų pažeidimą** (apetito stoka, besaikis troškulys, sumažėjęs šlapimo kiekis, kraujo atsiradimas šlapime) arba **klausos sutrikimą** (aukšto dažnio garsų negirdėjimas, spengimas ar zvimbimas ausyse, spaudimas ausies viduje);
- jeigu sergate **ilgalaikiu lėtiniu vidurinės ausies uždegimu**, ausies viduje Baneocin tepalo galite vartoti tik gavę aiškius gydytojo nurodymus, kaip tai daryti. Nevartokite Baneocin tepalo, jei ausies būgnelis yra pažeistas;
- jeigu didelis šio vaisto kiekis pateko į organizmą, gali pasireikšti **raumenų silpnumas**. Jei Jūs jau kenčiate nuo raumenų silpnumo (pvz., sergate sunkiąja miastenija, acidoze ar kita panašia liga), Jūsų būklė gali pablogėti;
- **ilgalaikis antibiotikų vartojimas** gali skatinti atsparių mikroorganizmų (bakterijų) augimą;
- atidžiai stebėkite, ar nepasireiškia **uždegimo** požymiai (karščio pojūtis, paraudimas, patinimas, skausmas) **ar grybelinių infekcijų** požymiai gydomojoje vietoje. Pasakykite savo gydytojui apie šiuos ar kitus neįprastus pasikeitimus;
- net jei infekcijos simptomai pagerėjo ar visiškai išnyko, tęskite Baneocin tepalo vartojimą **tik laiko, kiek paskyrė gydytojas**, tam, kad išnaikinti visas bakterijas ar išvengti infekcijos pasikartojimo;
- kol vartojate šio vaisto, venkite **saulės bei deginimosi soliariume**. Po apšvitinimo ultravioletiniais spinduliais gali pasireikšti fototoksinės odos reakcijos (odos paraudimas, patinimas, galimas niežulys).

Kiti vaistai ir Baneocin

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Ypač svarbu nevartoti Baneocin ir pasakyti savo gydytojui, jeigu vartojate bet kurio iš šių vaistų:

- **antibiotikų arba šlapimą varančių vaistų**. Kartu vartojant vaistų, kurie gali paveikti inkstų veiklą, pvz., **antibiotikų** (cefalosporinų arba kitų aminoglikozidams priklausančių antibiotikų) arba **šlapimą varančių vaistų** (pvz., etakrino rūgšties arba furozemido), žalingas Baneocin tepalo poveikis klausai ir (arba) inkstams gali sustiprėti;
- **narkotinių preparatų, anestetikų arba raumenis atpalaiduojančių vaistų**. Baneocin gali padidinti raumenų silpnumą, jeigu vartojamas kartu su anestetikais operacijos metu. Dėl šios priežasties, pasakykite gydytojui, jeigu vartojate Baneocin .

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia, arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

- Nevartokite Baneocin nėštumo ir žindymo laikotarpiu, nebent tai yra būtina. Laikantis atsargumo, nėštumo metu Baneocin gali būti vartojamas tik gydytojui nusprendus, kad galima naudoti yra didesnė už galimą pavojų.
- Jeigu maitinate krūtimi, netepkite šio tepalo ant krūtų ir saugokite, kad kūdikis nesiliestų prie gydomų kūno vietų.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažai tikėtina, kad šis vaistas galėtų sutrikdyti Jūsų gebėjimą vairuoti arba valdyti mechanizmus.

Baneocin sudėtyje yra vilnų riebalų.

Gali sukelti vietinių odos reakcijų (pvz., kontaktinį dermatitą).

3. Kaip vartoti Baneocin

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

Vartojimas suaugusiems ir vaikams

- Pažeistą vietą patepkite plonu tepalo sluoksniu 2 - 3 kartus per parą.
- Pažeistą vietą galima aptvarstyti.

Vartoti ant odos galima vartoti ne didesnę kaip 1 g neomicino paros dozę (tai atitinka 200 g Baneocin tepalo). Tokia doze galima gydyti **ne ilgiau kaip 7 paras**.

Jeigu gydymas kartojamas, reikia vartoti pusę minėtos didžiausios paros dozės.

Ką daryti pavartojus per didelę Baneocin dozę?

Jeigu pavartojote per daug Baneocin, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Stebėkite, ar neatsiranda bet kokių požymių, galinčių rodyti inkstų pažeidimą (apetito stoka, besaikis troškulys, sumažėjęs šlapimo kiekis, kraujo atsiradimas šlapime) arba klausos sutrikimą (aukšto dažnio garsų negirdėjimas, spengimas ar zvimbimas ausyse, spaudimas ausies viduje).

Pamiršus pavartoti Baneocin

- Jeigu pamiršote pavartoti tepalo, pasitepkite juo, kai tik prisiminsite.
- Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Baneocin

Vartokite Baneocin tiek laiko, kiek Jums nurodė gydytojas. Jeigu per anksti nutrauksite gydymą, infekcija gali atsinaujinti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Žemiau išvardintų šalutinių poveikių dažnis nežinomas.

Alerginės reakcijos (ypač vartojant ilgiau). Požymiai gali būti:

- odos paraudimas, sausumas ir lupimasis;
- odos išbėrimas, niežulys;
- gydomos infekcijos plitimas ar pablogėjimas.

Jeigu Jums pasireiškė šie požymiai, nutraukite tepalo vartojimą ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Vartojant vaisto ant didelių odos plotų:

Į organizmą prasiskverbusios veikliosios medžiagos gali sukelti šiuos šalutinius poveikius:

- pusiausvyros sutrikimas;
- klausos pažeidimą;
- inkstų veiklos sutrikimą;
- raumenų silpnumą.

Pabuvus saulėje ar kitokioje ultravioletinių spindulių apšvitoje, gali pasireikšti fototoksinės odos reakcijos (odos paraudimas, patinimas, galimas niežulys).

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nemokamu telefonu 8 800 73568 arba užpildyti

interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą ir pateikti ją Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vienu iš šių būdų: raštu (adresu Žirmūnų g. 139A, LT-09120 Vilnius), nemokamu fakso numeriu 8 800 20131, el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt, taip pat per Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę (adresu <http://www.vvkt.lt>). Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5. Kaip laikyti Baneocin

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Ant tūbelės ir dėžutės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

Baneocin sudėtis

- Veikliosios medžiagos yra bacitracino cinko kompleksas ir neomicino sulfatas. 1 g tepalo yra 250 TV bacitracino cinko komplekso ir 5000 TV neomicino sulfato.
- Pagalbinės medžiagos yra vilnų riebalai ir minkštasis baltas parafinas.

Baneocin išvaizda ir kiekis pakuotėje

- Homogeniškas, gelsvos spalvos tepalas.
- Tepalas tiekiamas aliumininėse tūbelėse po 20 g.

Registruotojas

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austrija

Gamintojai

Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10
A-6250 Kundl
Austrija

arba

Lek d.d.
Verovskova ulica 57
1526 Ljubljana
Slovėnija

arba

Salutas Pharma GmbH
Lange Goehren 3
D-39171 Osterweddingen
Vokietija

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. filialas
Šeimyniškių 3A
Vilnius LT-09312, Lietuva
Tel. +370 5 2636 037
El. paštas info.lithuania@sandoz.com

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2021-09-20.

Išsami informacija apie vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje <http://www.vvkt.lt/>.